

# Fino-Sint



## Formula anti-meteorismo

Integratore alimentare  
a base di estratti vegetali  
Soluzione idroalcolica  
Gocce 100 ml

### COMPOSIZIONE

<i>Cuminum cyminum</i>	T.M.
<i>Pimpinella anisum</i>	T.M.
<i>Foeniculum vulgare</i>	T.M.
<i>Coriandrum sativum</i>	T.M.
<i>Carum carvi</i>	T.M.

### INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Meteorismo, flatulenza.  
Spasmi del tratto gastrointestinale.  
Disturbi dispeptici.

### POSOLOGIA

Da 60 a 100 gocce per 2 volte al giorno, dopo i pasti principali.

### CONTROINDICAZIONI

Da non usare in pazienti con allergia accertata verso i singoli componenti.

### EFFETTI COLLATERALI

Non sono stati evidenziati effetti collaterali degni di nota, ai dosaggi terapeutici consigliati.

### TOSSICITÀ

Non segnalata in letteratura ai dosaggi terapeutici consigliati.

### INTERAZIONI CON ALTRI FARMACI

Nessuna interazione segnalata con altri farmaci, naturali o di sintesi.

 Sintesi

Formulazione del Dott. Roberto Miccinilli

# Fino-Sint



## Caratteristiche dei componenti

Fitocomplessi ad attività sinergica  
utili a favorire la funzionalità digestiva,  
la regolare motilità gastrointestinale  
e l'eliminazione dei gas

### **Cuminum cyminum L.**

Famiglia: *Apiaceae*

Parte utilizzata: i frutti (impropriamente detti semi)

Costituenti principali: olio essenziale (aldeide cuminica, idrocarburi terpenici: alfa e beta pinene, limonene, p-cimene) flavonoidi, tannini, mucillagini, olio 20%, proteine 18%.

Attività terapeutica: spasmolitica, antifermentativa, carminativa, digestiva.

Tossicità: effetti secondari non segnalati in letteratura, ai dosaggi terapeutici consigliati.

### **Pimpinella anisum L.**

Famiglia: *Apiaceae*

Parte utilizzata: i frutti (impropriamente detti semi)

Costituenti principali: olio essenziale 1,5 - 5 % (E-anetolo, estragolo, terpeni, sesquiterpeni), flavonoidi, cumarine, grassi 15 - 20%.

Attività terapeutica: spasmolitica, carminativa, antifermentativa, digestiva, antisettica intestinale, diuretica.

Tossicità: effetti secondari non segnalati in letteratura, ai dosaggi terapeutici consigliati.

### **Foeniculum vulgare MILL.**

Famiglia: *Apiaceae*

Parte utilizzata: i frutti (impropriamente detti semi)

Costituenti principali: olio essenziale (transanetolo 50-70 %, fencone 12-20%, estragolo, alfa-pinene, limonene), flavonoidi, acidi organici, lipidi, proteine.

Attività terapeutica: spasmolitica, antifermentativa, carminativa, digestiva, antisettica intestinale, diuretica, galattogoga.

Tossicità: effetti secondari non segnalati in letteratura, ai dosaggi terapeutici consigliati.

### **Coriandrum sativum L.**

Famiglia: *Umbelliferae*

Parte utilizzata: i frutti (impropriamente detti semi)

Costituenti principali: olio essenziale 1 % (D-linalolo, idrocarburi monoterpenici: alfa-pinene, limonene, canfora, p-cimene, terpinene), vitamina C, acido clorogenico, acido caffeico.

Attività terapeutica: spasmolitica, antisettica intestinale, carminativa, antifermentativa, digestiva.

Tossicità: effetti secondari non segnalati in letteratura, ai dosaggi terapeutici consigliati.

### **Carum carvi L.**

Famiglia: *Apiaceae*

Parte utilizzata: i frutti essiccati (impropriamente detti semi)

Costituenti principali: olio essenziale: 3-7 % (D-carvone, limonene), olio grasso (12-25%): ac oleico e linoleico, flavonoidi.

Attività terapeutica: spasmolitica, antimicrobica, antisettica intestinale, carminativa, antifermentativa, digestiva.

Tossicità: effetti secondari non segnalati in letteratura, ai dosaggi terapeutici consigliati.

SARANDREA MARCO & C. S.r.l. - via d'Alatri, 3b - 03010 Colleparado (Fr) - [www.sarandrea.it](http://www.sarandrea.it)